



**Datum:** 08.05.2019  
**Kontakt:** Ing. Veronika Heimlich, B.Sc.  
**T:** +43 505 55-36247  
**E-Mail:** pv-implementation@basg.gv.at  
**Unser Zeichen:** PHV-12016472-A-190508  
**Ihr Zeichen:**

---

**PHV-issue: Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer: Citalopram; Escitalopram**

Sehr geehrte Damen und Herren,

basierend auf einer Routinesignaldetektion kam das Pharmacovigilance Risk Assessment Committee in der Sitzung vom 8. bis zum 11. April 2019 zu folgenden Empfehlungen (siehe Anhang) für Citalopram; Escitalopram.

# Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer: Citalopram; Escitalopram – Arzneimittelwechselwirkung mit Fluconazol

## Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

### 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Daher ist bei einer gleichzeitigen Verwendung mit CYP2C19-Hemmern (z. B. Omeprazol, Esomeprazol, Fluconazol, Fluvoxamin, Lansoprazol, Ticlopidin) oder Cimetidin Vorsicht geboten. **Basierend auf der Überwachung von Nebenwirkungen während der gleichzeitigen Behandlung kann eine Reduzierung der Dosis von [Wirkstoff] erforderlich sein (siehe Abschnitt 4.4)**

## Packungsbeilage

### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von [Bezeichnung des Arzneimittels] beachten?

Andere Arzneimittel und [Bezeichnung des Arzneimittels]

Cimetidin, Lansoprazol und Omeprazol (zur Behandlung von Magengeschwüren), Fluconazol (zur Behandlung von Pilzinfektionen), Fluvoxamin (Antidepressivum) und Ticlopidin (zur Reduzierung des Schlaganfallrisikos). Diese können einen Anstieg der Konzentration von [Wirkstoff] im Blut verursachen.